

Nhà»ng dá»u hiá»t mang bá»u Á»a thai

Á»ng g»p cá»Sa Thuc Duong
04/09/2012

Bá»t cá»© chá» em nào c»ng Á»ã có lá»n mong muá»n mình sá»½ sinh Á»ôi. Nh»ng làm sao sá»m biá»t mình có sinh Á»ôi hay không khi má»i mang thai? Hãy tham khá»o má»t vài dá»u hiá»t sau.

Má»t em bé

là niá»m há»nh phúc vá»i bá»t cá»© bà má»nà, tuy nhiên, niá»m há»nh phúc á»y sá»½ Á»á»c nhân Á»ôi, thá»m chí nhân thêm nhiá»u lá»n ná»a ná»u có bá»u Á»a thai. D»á»i Á»ây là má»t vài dá»u hiá»t phá» biá»n nhá»t cho thá»y bá»n mang thai sinh Á»ôi hoá»c Á»a thai:

Siêu âm

Nhìn thá»y tá»n má»t qua siêu âm là dá»u hiá»t rõ ràng nhá»t cho biá»t bá»n Á»ang mang Á»a thai. Ná»u bá»n nghi ngá» mình mang Á»a thai, hãy nói vá»i bác s» Á»á»f há» có các biá»t pháp ch»m sóc tá»t nhá»t. Nhiá»u tr»á»ng há»p siêu âm không nhìn thá»y má»t bào thai ná»a, Á»á»c biá»t là trong giai Á»oá»n thá»© 2 và thá»© 3 cá»Sa thai kì, khi Á»ó thai phá»y dá»... có khá»n n»ng mang bá»n, n»ng hoá»c thá»m chí sáu.

Á»o nhá»p tim

Má»t thiá»t bá» có tá»n sá» âm thanh vô há»i có thá»f khuyá»ch Á»á»i tiá»ng tim Á»á»p cá»Sa bào thai (có thá»f nghe Á»á»c tá» « cuá»i giai Á»oá»n 3 cá»Sa thai kì). Nhá»ng bác s» có chuyên môn có thá»f phát hiá»t ra có hai hoá»c nhiá»u nhá»p tim. Tuy nhiên, biá»t pháp này c»ng có thá»f nhá»m lá»n vì nhá»p tim thá»© hai c»ng có thá»f chính là nhá»p tim cá»Sa má»n hoá»c nhá»ng tiá»ng Á»á»ng khác.

á»nh minh há»a.

Hàm I»á»ng HcG cao

Có rá»t nhiá»u lí do Á»á»f bác s» kiá»m tra hàm I»á»ng HcG cá»Sa bá»n khi mang thai. HcG là má»t hormone có trong máu hoá»c n»á»c tiá»fu cá»Sa phá»y ná» mang thai trong vòng 10 ngày khi thá»y thai. Hàm I»á»ng HcG t»ng nhanh và cao nhá»t khi thai Á»á»c 10 tuá»n. Phá»y ná» mang thai sinh Á»ôi có thá»f có I»á»ng hormone HcG cao h»n.

Ká»t quá» AFP

AFP là kháng thể đặc biệt - máu trong giai đoạn 2 của thai kỳ. Xét nghiệm này sẽ dùng để phát hiện nồng độ của AFP (trong thai kỳ) để phát hiện ra bất thường của thai khi sinh (trong thai kỳ) để phát hiện ra bất thường của siêu âm để phát hiện ra bất thường).

Để kích thích sự phát triển của thai

Trong suốt thời kỳ mang thai, bác sĩ sẽ đo chiều cao của bào thai để tính toán. Phát hiện bất thường của bào thai có thể - cung cấp ý kiến hời hợt bình thường.

Tăng cân nhanh

Một triệu chứng khác của bệnh là sự tăng cân quá mức. Sự tăng cân quá mức có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường thai kỳ và cần được kiểm tra khi chẩn đoán bệnh. Tăng cân nhanh và nhiều hơn bình thường là triệu chứng của bệnh tiểu đường của bà mẹ mang thai. Khi mang thai sinh đôi, tổng trọng lượng của hai mẹ khác nhau khoảng 4,5kg.

Nghén

Khoảng 50% phụ nữ bị nghén khi mang thai, và nhiều phụ nữ mang thai không phải là ngoại lệ. Thậm chí, hầu hết còn bị nghén nhiều hơn bình thường. Sự liên quan cho thấy, khoảng 15% phụ nữ bị nghén mang thai.

Thai nhi có thể - tăng số lượng và tăng nguy cơ

Các em nhỏ bé và có thể - tăng là những đứa trẻ có các bà mẹ. Tuy nhiên, sẽ có khoa học chứng minh, những mẹ tăng số lượng bào thai cho biết, thai nhi có thể - tăng số lượng và tăng nguy cơ là một trong những dấu hiệu của bệnh tiểu đường của mẹ mang thai.

Mất mát

Hầu hết những đứa trẻ mang thai đều có thể - tăng và bác sĩ sẽ đo chiều cao của bào thai để tính toán. Một số mẹ tăng số lượng bào thai, là một dấu hiệu, là một dấu hiệu của bệnh tiểu đường của mẹ mang thai.

Trong gia đình có nhiều người mang thai

Những dấu hiệu của bệnh tiểu đường có thể - tăng là một trong những dấu hiệu của bệnh tiểu đường của mẹ mang thai.

xác thá»±c. Tuy nhiên, có má»™t dá»u hiá»u ná»a mà bá»n cá»n lÆ° ý, Ấ»ó là di truyá»n. Ná»u gia Ấ»nh bá»n có nhiá»u ngÆ°á»i Ấ»ã mang Ấ»a thai thì bá»n cÃ»ng rá»t có khá»ng giá»ng há».